CARTE DE PATIENT

APIXABAN KRKA (apixaban)

631384

XXXXXX

Portez cette carte sur vous en permanence/ Cette carte doit toujours être avec l'enfant ou la personne qui s'en occupe.
Présentez cette carte au pharmacien, au dentiste et tout autre professionnel de santé avant les traitements.

Information destinée aux patients/ soignants

- Prendre/ donner APIXABAN KRKA à heures fixes, comme indiqué par votre médecin. Si vous oubliez une dose le matin, prenez/donnez-la dès que vous vous en apercevez. Elle peut être prise/ administrée en même temps que la dose du soir. Une dose oubliée le soir ne peut être prise/ administrée qu'au cours de la même soirée. Ne prenez pas deux doses le lendemain matin, mais au contraire continuez le lendemain à prendre le traitement selon le schéma habituel deux fois par jour conformément à la prescription.
- N'arrêtez pas prendre/donner le traitement par APIXABAN KRKA sans en avoir parlé au médecin car le patient risque de faire un accident vasculaire cérébral (adultes) / la formation d'un caillot sanguin (patients pédiatriques) ou de subir d'autres complications.
- APIXABAN KRKA aide à fluidifier le sang. Cependant, cela peut augmenter le risque de saignement.
- Les signes et les symptômes de saignement incluent des ecchymoses ou des saignements sous la peau, des selles noires, du sang dans les urines, des saignements du nez, des sensations vertigineuses, de la fatigue, pâleur ou faiblesse, maux de têtes intenses et soudains, crachat de sang ou vomissement de sang.
- Si le saignement ne s'arrête pas de lui-même, **demandez immédiatement un avis médical.**
- En cas de chirurgie ou d'une quelconque procédure invasive, informez votre médecin que vous prenez APIXABAN KRKA/ informez le prestataire de soins de santé que l'enfant prend APIXABAN KRKA.

fevrier 2026

Information destinée aux professionnels de santé

- ♦ APIXABAN KRKA (apixaban) est un anticoagulant oral agissant par inhibition directe et sélective du facteur Xa.
- ♦ APIXABAN KRKA peut augmenter le risque de saignement. En cas d'évènements hémorragiques majeurs, il doit être arrêté immédiatement.
- ♦ Le traitement par APIXABAN KRKA ne nécessite pas de surveillance de routine de l'exposition. Un test quantitatif calibré anti-Facteur Xa peut être utile dans des situations exceptionnelles, par exemple en cas de surdosage ou d'intervention chirurgicale d'urgence (les résultats des paramètres de la coagulation, temps de prothrombine (TP), rapport normalisé international (INR) et temps de céphaline activé (TCA) ne sont pas recommandés) - voir le RCP.
- ♦ Un agent permettant d'inverser l'activité de l'anti-Facteur Xa d'apixaban est disponible pour les adultes, cependant, sa sécurité et son efficacité n'ont pas été établies chez les patients pédiatriques (se référer au RCP de l'andexanet alfa).

Je suis sous traitement anticoagulant avec APIXABAN KRKA (apixaban) pour prévenir la formation de caillots sanguins.

Veuillez compléter cette section ou demander au médecin de le faire

Nom :

_____

Date de naissance :

_____

Indication :

_____

Poids (pour la population pédiatrique) : _____

Dose : _____ mg deux fois par jour

Nom du médecin :

_____

_____

N° de téléphone du médecin :

_____